

Inleiding	4
Soorten van A-Z	7
Register	177
Fotoverantwoording	183

© 2022 Rebo International B.V.

Deze uitgave: © 2022 Rebo Productions B.V.,  
Noordwijkerhout, [www.rebo-publishers.com](http://www.rebo-publishers.com)

Tekst: Hanneke van Dijk

Beeld: George M. Otter

Shutterstock.com omslag, blz. 71, 74, 76, 79, 168

Redactie en opmaak: Textcase, Deventer

Omslagontwerp: by Eefje

ISBN 978-90-366-4398-6

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

#### Disclaimer

De auteur en uitgever van dit boek kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ziekten en sterfgevallen als gevolg van het eten of plukken van zaden, vruchten of gewassen die in dit boek worden besproken, noch voor een verkeerde handelswijze die eventueel naar aanleiding van dit boek wordt gevolgd.





*Euonymus europaeus*

hoortjes aan lange steeltjes die als ze openen oranje zaden laten zien. De groenblijvende kardinaalsmutsen lijken afgezien van hun vruchten helemaal niet op de bladverliezers. *Euonymus fortunei*, Japanse kardinaalsmuts, heeft groen blad, wordt 1,5 m hoog maar kan ook

tegen een muur klimmen of als bodembedekker of haagje gebruikt worden. De oorspronkelijke groene vorm wordt zelden aangeplant, bijna altijd wordt de voorkeur gegeven aan een van de vele bontbladige cultivars, zoals de goubonte *Euonymus fortunei* 'Emerald 'n Gold'.

## *Exochorda* parelstruik



Van deze uit centraal China afkomstige plant bestaan maar een paar soorten, kruisingen en cultivars. De meest voorkomende *Exochorda* 'The Bride', die al in 1904 in een catalogus voorkwam, heeft hangende takken. In april en mei bloeit deze 2 tot 2,5 m hoge plant met zuiverwitte bloemen aan de uiteinden

van de takken. De bloemknopjes lijken op parels. Na de bloei verschijnen de bruingroene stervormige vruchtjes. De struik hoeft niet gesnoeid te worden, hoogstens kunnen de lange takken in het voorjaar teruggenomen worden om de plant in model te houden. Ook geschikt als gevelplant.


## Forsythia Chinesees klokje



Vroeg in het voorjaar is een Chinees klokje niet te missen. De struik is dan overdekt met gele bloemen. Het is een wat slordig groeiende struik die het beste na de bloei flink teruggesnoeid kan worden om een goed model te houden. Door de uitgebloeide takken eraf te knippen wordt de groei van nieuwe scheuten gestimuleerd die het volgende jaar bloeien. Na de bloei is het een saaie struik zonder verdere sierwaarde. Van de zes soorten komen er vijf oorspronkelijk in China, Japan en Korea voor. *Forsythia x intermedia* ontstond al in 1878 uit een kruising van *Forsythia suspensa* en *Forsythia viridissima*. Van deze kruising werden veel cultivars ontwikkeld. *Forsythia x intermedia* 'Spectabilis' bloeit rijk en wordt het meeste gekweekt. *Forsythia x intermedia* 'Densiflora' heeft grotere bloemen, maar bloeit iets minder rijk.



*Forsythia x intermedia*



*Forsythia x intermedia*

## Fothergilla lampenpoetsersruik



*Fothergilla major*

Deze lage bladverliezende struikjes komen oorspronkelijk uit het oosten van de Verenigde Staten. *Fothergilla gardenii* wordt 1 m hoog en bloeit in april met geurende witte bloemen. De bloemen hebben geen kroonbladen, maar bestaan uit toefjes meeldraden. Tegelijk met

de bloemen loopt het blad uit dat in de herfst opvallend mooi verkleurt naar geel, oranje en rood. *Fothergilla major* wordt 2-2,5 m hoog, de witte bloemen die samen een bolvormige bloeiwijze vormen zijn iets roze van kleur. Ook deze soort heeft een mooie herfstkleur.

## Fraxinus es



*Fraxinus angustifolia* 'Raywood'

De gewone es, *Fraxinus excelsior* komt in heel Europa in het wild voor. De boom kan 30-40 m hoog worden en is bladverliezend. De bladeren bestaan uit 7-13 deelbladjes en ze bloeien voordat ze in blad komen. Essen lopen laat in het voorjaar uit in opvallende zwarte bladknoppen. Na de bloemen verschijnen de gevleugelde vruchten die door de wind verspreid worden. De es laat zich net

als een wilg goed knotten en het sterke essenhout wordt o.a. gebruikt voor stelen van gereedschap. De laatste jaren heeft een uit Oost-Azië geïmporteerde schimmel voor een kaalslag onder de essen gezorgd. Infectie met deze schimmel zorgt voor de essentaksterfte. Veel bomen moesten omgezaagd worden. Onaangetaste bomen worden gebruikt om resistente rassen van te kweken.

*Fraxinus ornus*, pluimes, *Fraxinus americana*, Amerikaanse es, en *Fraxinus pennsylvanica*, zachte es, zouden minder gevoelig zijn. *Fraxinus excelsior* 'Pendula' is een langzaamgroeiende boom met sterk afhangende takken die 8-10 m hoog wordt. *Fraxinus excelsior* 'Jaspidea', goudes, wordt 10-12 m hoog, heeft gele twijgen en geelgroen uitlopende bladeren die lichtgroen worden en een opvallende goudgele herfstkleur. De 15-20 m hoge smalbladige es, *Fraxinus angustifolia* 'Raywood', verkleurt in de herfst bijzonder mooi oranje tot paarsrood.



*Fraxinus excelsior* 'Pendula'



*Fraxinus angustifolia* 'Raywood'