

Halsbandparkiet

*Psittacula
krameri*



- Familie: papegaaien
- Grootte: ca. 42 cm (incl. staart)
- Geluid: krijsen
- Voedsel: vruchten, bessen en zaden
- Nest: in boomholen, oude nestholen van spechten
- Trekgedrag: standvogel
- Leefgebied: parken en grote tuinen | in opmars

Exoot

De halsbandparkiet is een exoot: deze vogel heeft zich gevestigd in een gebied waar hij normaal niet leeft. Hij komt oorspronkelijk voor in tropisch Afrika en het zuiden van Azië. In het midden van de vorige eeuw ontsnapten er enkele vogels uit kooien of werden er bewust vrijgelaten. Deze vogels wisten zich in onze natuur goed te redden en konden zich voortplanten. Ondertussen leeft de halsbandparkiet als exoot in Vlaanderen en Nederland.

De halsbandparkiet dankt zijn naam aan de dunne zwarte 'halsband' rondom zijn groene nek. Achteraan op zijn kop is de halsband oranje-roze. Vrouwtjes hebben deze halsband niet.



Vrouwtje
(voorzijde kaart:
mannelijke)

Merel

Turdus merula



- Familie:** lijsters
- Grootte:** ca. 26 cm
- Geluid:** gevarieerd, melodieus gefluit
- Voedsel:** wormen, slakken, bessen, vruchten
- Nest:** in bomen of struiken, aan huizen...
- Trekgedrag:** standvogel of deeltrekker
- Leefgebied:** akkers, parken, tuinen, steden | veelvoorkomend

Vroeger was de merel een schuwe bosvogel. Op een gegeven moment is hij echter gewend geraakt aan de mens en ons gevolgd naar onze woonplek. Tegenwoordig leeft hij in dorpen, maar ook in grote steden. Sommige merels bouwen hun nest zelfs op een balkon of vensterbank.



Vrouwkje
(voorzijde kaart: mannetje)

Cultuurvolger

Dieren die zich zo gedragen, worden **cultuurvolgers** genoemd. Maar wees voorzichtig: als je te dicht bij het nest of de jongen komt, zullen de ouders beide heel heftig verdedigen en deinzen ze er niet voor terug je met hun spitse snavel aan te vallen.

Scholekster

*Haematopus
ostralegus*



- Familie: scholeksters
- Grootte: ca. 43 cm
- Geluid: een luid '(te-)piet'
- Voedsel: schelpdieren, slakken, kreeftjes, wormen
- Nest: kuil in de grond of het gras
- Trekgedrag: standvogel of trekvogel
- Leefgebied: (kiezel)stranden, maar ook akkers of korte graslanden | wordt zeldzamer

Typische kustvogel

Het opvallendste kenmerk van de scholekster is de lange helderrode snavel. Daarmee port hij in de grond naar voedsel. Hij is dol op zeepieten die zich in het slik schuilhouden. Sommige scholeksters 'spoelen' de wormen in een plas om het zand eraf te halen. Scholeksters kunnen wel 20 jaar oud worden. Wees voorzichtig als je een strandwandeling maakt tijdens de broedperiode in het voorjaar: de vogels verdedigen hun nest en hun jongen en zijn daarbij vrij agressief.



De eieren liggen vaak zo op de grond.

Witte kwikstaart

*Motacilla
alba*



- Familie: kwikstaarten
- Grootte: ca. 18 cm
- Geluid: 'tsi-tsick', 'sji-liét'
- Voedsel: insecten, spinnen, kleine visjes
- Nest: in rots- of muurspleten, tussen wortels...
- Trekgedrag: deeltrekker
- Leefgebied: open landschappen | veelvoorkomend

De witte kwikstaart kan je tegenkomen op zowel akkers, velden en weiden als in parken of tuinen. Alleen van het bos houdt hij niet. Op zoek naar voedsel loopt hij snel trippelend heen en weer en pakt insecten van de grond of vangt ze uit de lucht. De witte kwikstaart is goed te herkennen aan de lange, wippende staart.



Nest van witte kwikstaart in een muur

Halfholenbroeder

De witte kwikstaart is een halfholenbroeder: hij bouwt het nest, dat met zachte materialen is bekleed, op de grond of op een andere halfopen plek – vaak in de buurt van mensen, want net als de merel is de kwikstaart een **cultuurvolger**.