

DE NIEUWE GIDS
VOOR DE NIET-BESTAANDE

VOGELS
VAN
EUROPA

O.C.Hooymeijer

Colofon

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door:



Idee: O.C. Hooymeijer
Tekst: O.C. Hooymeijer
Oliepastels en inkttekeningen: O.C. Hooymeijer
Artdirection: O.C. Hooymeijer
Reprografie: Linus Harms
Ontwerp omslag en binnenwerk: Jelle F. Post
Opmaak binnenwerk: Villa Grafica
Foto auteur achterzijde: R. van Herwaarden
Drukken en binden: Grafistar

NUR 435

ISBN 978-90-5615-496-7

© O.C. Hooymeijer 2019

Alles uit deze uitgave mag zo veel mogelijk worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt, door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze ook, mits er toestemming is gevraagd aan de uitgever.

Uitgeverij Noordboek is een imprint van zo Leafdesdichten
en in liet fan wanhoop BV

www.noordboek.nl

www.ochooymeijer.com

*'Het is niet waar, maar het
had waar kunnen zijn'*

O. E. Hooymyzer.

*'If I could only fish half as good as a
Sea Vulture, I would be a happy man'*

Ernest Hemingway

'A spiritu videt plura avium'

Parmenides

Inhoudsopgave

Karakterisering van de biotopen	10
Wetenschappelijke benamingen	12
Waarnemingsdetails, snavelvorm en -functie	13
Lijst van afgebeelde, niet-bestaande vogels	14
Soortbeschrijvingen	17
Recepten	217

Karakterisering van de biotopen



Volle zee (windstil):

o.a. Schonk, Zeebrons,
Zeedrijver



Volle zee (storm):

o.a. Zeegier, Visgluiper,
Zwartkopzeeduif



Cultuurgronden met verspreide boomgroepen:

o.a. Oudhaan, Brilhoen, Akkertje,
Lentezwaaitje



Ruige rotskust:

o.a. Sneeuwkraak, Rotsliever,
Blindkuif



Duinkust met uitgestrekt zandstrand:

o.a. Meester, Schelpenkoning, Alg



Onherbergzame ruige bergulaktes:

o.a. Wringer, Zweedkrat, Snot, Zwartrugluiper



Cultuurland, weidegrond met lichte bebouwing:

o.a. Prikkie, Tak, Lentezwaai, Draadglijder, Mestpikker, Bermfluit



Bossen. Naald, loof en gemengd:

o.a. Berkenprins, Bakker, Schemeraar, Bosliever



Steden en dorpen:

o.a. Kuifpink, Napolitaan, Ketelaar, Engelse Jan, Meut




Nachtlandschappen:


o.a. Nachtvrees, Schotse Nachtduif, Schemeraar, Grote Nachtsjager

Wetenschappelijke benamingen

Interieur



Exterieur



Waarnemingsdetails, snavelvorm en -functie



Kraakvorm
Noten en harde
vruchten




Puntkraakvorm
Noten en schelpdieren



Bijlvorm
Haarwild



Haakbijlvorm
Gladde vissen



Blikopenervorm
Schelp en schaaldieren



Stokvorm
Pieren en grondlarven



Steekstokvorm
Alle dierlijke prooien




Grote Steekvorm
Grote insecten en
geleedpotigen



Kleine Steekvorm
Kleine insecten en
geleedpotigen



Persvorm
Zacht fruit, rupsen
en larven



Zijaanzicht



Bovenaanzicht

Lepelvorm
Algen en kleine
kreeftachtigen

Lijst van afgebeelde, niet-bestaande vogels

Berkenprins	<i>araplatis mhuriatos</i>	18
Kuifpink	<i>prihngilla rudos</i>	22
Prikkie	<i>phiqueadus res</i>	26
Tak	<i>diundriucipus strux</i>	30
Schemeraar	<i>luz noctantus luz</i>	34
Duitse Reiger	<i>ariër stannus gigantus</i>	38
Lentezwaaitje	<i>phrovhoreanus salhudias</i>	42
Zeebrons	<i>crux crux mareus</i>	46
Meester	<i>meastrocephaleus prixus</i>	50
Draadglijder	<i>ghalisius melanoceplix</i>	54
Witkopzwaag	<i>lenius hispus</i>	58
Zwartkopzeeduif	<i>phenevea mharum negra</i>	62
Napolitaan	<i>voce napholieatheamus</i>	66
Zweedkrat	<i>spex shcandinhavius</i>	70
Schelpenkoning	<i>ghriseamhiar rex</i>	74
Nachtvrees	<i>aetheamorizadus noctornus</i>	78
Schotse Nachtduif	<i>pheruvea scottia</i>	82
Ketelaar	<i>chaleathorius prudex</i>	86
Engelse Jan	<i>justius justius brit</i>	90
Alg	<i>aelegealus rex</i>	94
Mestpikker	<i>pleaduras fhecealius</i>	98
Bakker	<i>constrixius fharhinia</i>	102
Wapenaar	<i>rhixht rhex</i>	106
Zeedrijver	<i>marum lux lux</i>	110
Zeegier	<i>phgyppyapius mharus</i>	114
Grote Nachtjager	<i>gholiath nocturias</i>	118
Akkertje	<i>aegrealius rufus</i>	122
Snot	<i>khalenealix fhorus</i>	126
Meut	<i>mervas pyrrealhius</i>	130
Zomerstekel	<i>phicaidea verinea pica</i>	134

Zwartruggluiper	<i>ghalipius nhero</i>	138
Bermfluitier	<i>phyllidos avheadealix</i>	142
Sneeuwkraak	<i>croqius nheavialius</i>	146
Bosliever	<i>ahmorius arbo</i>	150
Rotsliever	<i>ahmorius roca</i>	154
Kleine Laars	<i>bottax peculias</i>	158
Hark	<i>usus phlanteax</i>	162
Blindkuif	<i>nonvhealeamus rhufus</i>	166
Snaak	<i>ghanmerops upiuster</i>	170
Zwartruggleuf	<i>vhaghineus negra negra</i>	174
Transportfluitier	<i>thransporthex flux</i>	178

Kanshebbers voor de toekomst

Visgluiper	<i>ghalipius ippo</i>	184
Brilhoen	<i>occularius gordeas varia</i>	188
Oudhaan	<i>jhuvenalhus anthios</i>	192
Steenkrent	<i>ulvias dhuerras</i>	196
Schapenkris	<i>bhala bhaliac</i>	200
Schonk	<i>marcus sehpealis</i>	204
Tweekant	<i>duplex duplex symhetrix</i>	208
Kaalkopwringier	<i>presser baltheus</i>	212

Verklaring der tekens

♂ = mannetje

♀ = vrouwtje

D = doorkomer

W = wintervreter

Ze = zeldzaamheid

B = broeder

K = kortvleugelig

P = periodisch


O = onzeker

Z = zomervriend

E = eetbaar

NE = niet eetbaar

SM = smakelijk



Verspreidingskaart



Geluidsindicatie,
zang of roep in PF

Soortbeschrijvingen

Nieuw ontdekte niet-bestaande vogels.
Minstens 22 door de VBNBV geaccepteerde
waarnemingen per jaar.

Berkenprins

(araplatis mhuriatos)

Volksvogelwijsheid

Herkomst: Polen (Biebranski)

‘Książę ścina drzewa szybciej niż piła’

Vertaling:

‘De Prins velt de boom sneller dan de zaag’



Berkenprins

WPO

(*araplati mhuriatos*)

E Sm

L 58 cm - V 105 cm

Algemene, doch plaatselijke bewoner van de zogenaamde oerbossen, met een voorkeur voor met wilg en es, maar vooral met berk begroeide natte velden.

Leeft meest van insecten en geleedpotigen die zich onder de schors van bomen bevinden. Bij zijn speurtochten naar voedsel kan de Berkenprins hele bomen in zeer korte tijd van hun bast ontdoen en daarmee een spoor van vernieling onder de houtopstand veroorzaken. Bij deze nogal vermoeiende werkzaamheden worden regelmatig pauzes ingelast, waarbij de vogel zich met gespreide vleugels tegen een dikke berk 'aanplakt'. Bosgebieden waar de Berkenprins frequenteert kunnen in slechts enkele maanden veranderen in dode bossen. In de voormalige Oostbloklanden wordt de vogel door de plaatselijke houtvesters dan ook fanatiek bejaagd! In Portugal wordt de vogel echter afgericht en ingezet bij het ontbasten van de kurkeiken.

Door zeer goed camouflagekleed is de Berkenprins moeilijk te onderscheiden, maar de hooggerekte, miauwende klanken verraden veelal zijn aanwezigheid.



II - VI



hooggerekt 'miauwen'



in berk pikkend

Kuifpink

(prijngilla rudos)

Volksvogelwijsheid

Geen



Kuifpink

BWZ

(*prihngilla rudos*)

E Sm

L 16 cm


Talrijk. Allesetende, sterk aan de mens gebonden zanger. Echte stadsbewoner. Nestelt in tuinen en parken, maar bouwt nest ook wel in gaten of op richels van in verval geraakte leegstaande panden. Foerageert vaak op pleinen en straten waarbij brutaal gedrag opvallend is. Kan in de buitenlucht lunchende kantoormedewerkers, bankemployees, maar ook fabrieksarbeiders lastigvallen met bedelgedrag. In herfst regelmatige gast in boomgaarden op het platteland, vaak samen met Kleine en Grote Gele Fruitpikker. Verenkleelede kleurig. Zie rode en gele accenten en forse warrige kuif. Snavel licht gebogen. Donkere oogstreep geeft de vogel een wat 'streng' uitstraling.

Balts, een onregelmatige draaiende vlucht, liefst vanaf een molschoop, maar ook een steen of vuilniszak voldoet.

Roep, een helder kraaien, afgewisseld met schorre 'kchu, kchug' klanken. Zang, meest vanaf hoge post, een aaneengesloten melodie van zeer gevarieerde fluittonen, met altijd een triool als afsluiter.



XIII - XII



'kchug' klanken



baltsvlucht vanaf molshoop



bij bessenstruik