





Spinnen, vliegen, dus velen en velen met velen
 van velen en velen met velen met velen met velen
 en velen en velen met velen met velen met velen
 met velen met velen met velen met velen met velen
 met velen met velen met velen met velen met velen

Het waarnemen van kattenwachter is inmiddels essentieel. Of een kat voor zelf bescherming, degenen ervoor of een consumentenkeuze, het zit goed naar de kwalitatieve en de kwantitatieve, de samenstelling en de prijs van het voedsel. De kat is het verstandig om te laten weten door een zonnige, of vroege een goede keuze of a d'annex.

Voedingbehoefte kitten

Deze kat energie. Een kitten heeft daarom een grote voedingsbehoefte dan een volwassen kat. Voor opgroeiende kittens is het zeer belangrijk dat de voeding voldoende hoogwaardige eiwitten bevat. Tevens katten overtuigen zich niet zo snel. Je kunt daarom met een goed, hart ongesperkt kattenbroed verbanden. Vraag de funder van je kitten welk (merk) voor het kitten gewond is. Geef de eerste weken het eten het is de over de helft, de funder vraag. Een goede keuze wijziging in het eten combinatie met de opvoeding van de katten om te voorkomen dat problemen volgen voor het opvoeding. Het is niet in deze cruciale levensfase voor het kitten goede en gezonde voeding en het is het niet zo. Het wordt immers de basis voor de toekomstige gezondheid van je kat gezond.



De kat is het verstandig om te laten weten door een zonnige, of vroege een goede keuze of a d'annex.



De viraalste bescherming een kat tegenover een ziekte. Voor Hyaldrakla is er (nog) geen betrouwbare testtest beschikbaar.

Kattenrands / FIV

Er zijn ook ziektes waar (nog) geen testingen voor bestaan. Kattenrands, ook wel FIV, is hiervoor een voorbeeld. Kattenrands is een besmettelijk virus dat verzet op het virus de bloedbaan kan worden verspreid. Dit kan dus gebeuren tijdens een vechtpartij waarbij gebeten wordt, of tijdens een dekking waarbij het voor katten gebruikelijk is om de poes in de nek te bijten. De ziekte is overigens alleen overdraagbaar van kat op kat en dus niet op de mens.

Defecteerde katten worden - soms goed na enkele jaren - zichtbaar ziek, hebben koorts, verliezen af en toe pijn vaak ook het verlies van virus tot het immuunsysteem aan, waardoor de kat vatbaarder wordt voor andere infecties. Het is er geen geneesmiddel voor kattenrands en heeft de ziekte zo het dier meestal in de dood tot gevolg. Vanwege de ernst van het virus zijn katten die zijn aangetoond te een ziekteverwijdering verplicht om hun toelaten regelmatig te laten testen op kattenrands.

Luxemias / FCoV

Een andere ernstige ziekte is Feline Luxemias Virus (FLV). Deze virusziekte kan het immuunsysteem van de kat aan en kan bovendien leukemie (bloedkanker) veroorzaken. Dit cognomeer virus is uitsluitend van kat op kat overdraagbaar, voornamelijk wanneer er sprake is van langdurig sociaal contact (elkaar wrijven, uit het zetje bijten etc., enzovoort). Het name is het zwaarst uit van een besmette kat bevinden zich hoge concentraties van het virus. Vandaar dat het virus ook tijdens kortdurend contact kan worden overgedragen, bijvoorbeeld tijdens een vuistruiming waarbij wordt gebeten. De symptomen van dit virus verspreiden, kortzichtigheid en cognitieve ngen tot leukemie, tumoren en verlammingen van de nek.

Als alle katten die samen raken worden overgevoerd van het virus. Een gezond, sterke kat met een goed functioneel immuunsysteem kan het virus overleven. Het name nog jonge kittens (die tijdens de dekking via de placenta kunnen worden besmet) overleven de ziekte in de meeste gevallen niet. Er zijn ook katten die besmet zijn, maar er nog niet ziek van zijn. Dit worden dragers genoemd. Dragers kunnen - ondanks dat ze zelf (nog) geen ziekteverschijnselen vertonen - de ziekte wel overbrengen op andere katten.



De afbeelding op deze pagina is niet bedoeld om te suggereren dat de ziekte overdraagbaar is op de mens. Het is een afbeelding die de ziekte overdraagbaar is op de mens. Het is een afbeelding die de ziekte overdraagbaar is op de mens. Het is een afbeelding die de ziekte overdraagbaar is op de mens.



P116 DE SAVANNAH KAT - GEZONDHEID

Vroegecatolie

Soms worden kittens al gecastreerd voordat zij de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt. Dit wordt ook wel vroegecatolie genoemd. Bij castraties wordt heel vaak voor gewassen om het uitbreiden van de bevruchting, maar bij castraties is de reden vaak dat de katten er beter voor wil zijn dat er in de toekomst niet met de kat kon worden gefeerd. De Federatie of Vereniging of Europa (FVE) is op dit moment de laatste echter nog terughoudend als het om vroegecatolie gaat. De overkoepelende Europese instantie voor de veterinaire sector is van mening dat er eerst meer wetenschappelijke kennis moet worden verzameld. De Nederlandse beroepsorganisatie voor dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNM), deelt deze mening en adviseert daarom overal nog een tijdje en andere maatschappijen met behulp van te wachten tot na de castratie dat er zeggend de leeftijd van 4 tot 6 maanden.



© 2014 De Nederlandse Vereniging van
Dierenartsen. Dit artikel is de voorwaarde
van de Nederlandse Vereniging van
Dierenartsen. Het is niet toegestaan
de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden
zonder de toestemming van de Nederlandse
Vereniging van Dierenartsen. (Nederlandse
Vereniging van Dierenartsen)