



20-36 cm

**Oost-Afrikaanse****Driehoornkameleon** (*Trioceros jacksonii*) **Jackson's Chameleon**

Het is een forse kameleon. De tong haalt zelfs bijna een lengte van twee keer het lijf. De mannetjes hebben drie opvallende kophoorns die dienen om elkaar te imponeren. Bij de veel kleinere wijfjes ontbreken deze of zijn veel kleiner. Deze kameleon komt voor op hoogtes van 1600 – 2500 m in vochtige tropische bossen van de Aberdares en de westelijke en zuidwestelijke hellingen van Mt. Kenya. In Tanzania op de hellingen van Mt. Meru. Ook in plantages komen ze veel voor, omdat hier veel insecten op de planten afkomen. Deze kameleon is levendbarend. Er zijn drie ondersoorten die qua kleurstelling van elkaar verschillen. De basiskleuren zijn groen met witte en gele tinten en verkleuren naar oranjebruin tot donkerbruin, vooral tijdens de paartijd. Het wijfje kleurt volledig groen als zij ontvankelijk is.

**Mellers Kameleon** (*Trioceros melleri*) **Meller's Giant One-Horned Chameleon**

Het is de grootste kameleon in Afrika. Mannetjes worden ongeveer 60 cm lang, vrouwtjes blijven kleiner. Mellers kameleon heeft losse oorkwabben en twee kleine hoorntjes vooraan op de neus en op het voorhoofd. De basiskleur is groen, maar deze kan veranderen van bijna wit tot donkerbruin. De dwarse banen zijn lichtgroen of felgeel. Zijn habitat bestaat uit bomen en struiken in savannen en bosgebieden met veel schaduw. Vanwege zijn omvang worden grotere insecten gegeten, maar ook wel vogels en hagedissen. Deze kameleon is zowel tegen mensen als soortgenoten bijzonder agressief en bijterig. Eenmaal per jaar legt het wijfje circa 80 eitjes. Mellers kameleon kan een leeftijd bereiken van 12 jaar, wat voor kameleons oud is.



38-60 cm



15 cm

**Tweestrepen Kameleon****(Trioceros bitaeniatus) Side-striped Chameleon**

Er bestaat officieel nog geen Nederlandse naam voor deze kameleon. Over de flanken liggen twee strepen, bij het wijfje kunnen dit ook vlekjes zijn. De kleur verandert van groen naar grijsbruin, al naar gelang zijn omgeving en stress. Zijn leefomgeving omvat de berghellingen van Mt. Kenya en het Aberdare gebergte en Lake Naivasha in Kenia, de Kilimanjaro in Tanzania en Mt. Elgon in Oeganda en Kenia. Daar komt hij voor op hoogtes tot 3000 – 4000 m. Ze hebben een voorkeur voor *Hagenia*, een struiktype dat vooral op de hoger gelegen delen groeit en de Hertshooi, een kruidachtige plantengeslacht. Daar beklimmen ze de takken op 1 à 2 meter boven de grond. Zij is eierlevendbarend (ovovivipaar – het bevruchte ei wordt in het moederlichaam uitgebroed). De 2 tot 18 jongen worden na 3 à 4 maanden in een vlies geboren waar ze binnen enkele minuten na geboorte doorheen breken.

**Hoehnel's Kameleon** (*Chamaeleo hoehnelii*) **Von Höhnel's Chameleon**

Deze kameleon heeft een verhoogde kam op het achterhoofd. De vrouwtjes blijven kleiner en hebben een beduidend kleinere kam. De kleuren variëren van olijfgroen tot bruin. De mannetjes hebben vaak ook blauwe of gele kleuren, er is echter veel variatie. Hoehnel's kameleon leeft in begroeiing als struiken en hagen, maar ook in tuinen en klimt niet al te hoog. De soort leeft in Kenia en Oeganda, in savannen, berghellingen en hoogvlaktes (1200-3000 m) waar de luchtvochtigheid hoog is. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden als insecten. Hoehnel's kameleon is eierlevendbarend en het aantal jongen verschilt sterk; 5 tot 20 in een periode van 5 maanden.



15-25 cm

