



Frans: Mésange bleue
Engels: Eurasian Blue Tit
Duits: Blaumeise



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Verschil geslachten

♂ en ♀ zien er hetzelfde uit.

Algemeen

De pimpelmees mag een van onze bekendste mezen genoemd worden. Samen met de koolmees (108) is ze een van de talrijkst waargenomen vogelsoorten op de voedertafel waar ze op zoek gaat naar zonnebloempitten en andere zaden. Deze mees heeft een heldere uitstraling dankzij haar azuurblauw en citroengeel verenpakje. Ze verschilt van de andere mezen door haar witte kop en zwarte oogstreep. Ondanks haar kleine formaat is ze zeer temperamentvol: ze laat zich niet zomaar wegsturen door de grotere koolmees.

Habitatvoorkeur

Dankzij haar opportunisme broedt de pimpelmees nagenoeg overal, net zoals de koolmees. De hoogste dichtheden worden vooral aangetroffen in parken, tuinen en in oude loofbossen. Van nature is het echter een soort van oude eikenbossen met ondergroei.

Voedsel

Insecten en hun larven, spinnen en andere geleedpotigen. 's Winters ook zaden, pinda's.

Nest en nestplaatskeuze

Pimpelmezen nestelen in holten van allerlei typen, meestal in een boom of muur. Ze nemen gemakkelijk nestkasten in gebruik met een invliegopening die liefst niet groter is dan 30 mm. Het nest is een komvormig bouwsel van mos, gras, bladeren, wol en haar.

Broedsel

Doorgaans 7-12 eieren • Eén legsel per jaar, soms twee.



Trek- of standvogel

Pimpelmezen in België en Nederland zijn overwegend standvogel.

Mogelijk te verwarren met ...

De pimpelmees is moeilijk met andere soorten in deze gids te verwarren.





Europese kanarie

Serinus serinus

Lengte: 10 - 12 cm
Spanwijdte: 20 - 23 cm
Lichaamsgewicht: 12 - 15 g

Frans: Serin cini
Engels: European Serin
Duits: Girlitz



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Verschil geslachten

♂ en ♀ zien er verschillend uit.

Algemeen

De Europese kanarie is het kleinste lid binnen de Europese vinkenfamilie. Verhoudingsgewijs heeft dit vogeltje een relatief grote kop. Hij onderscheidt zich van de andere vinken door de wat jojo-achtige, stuiterende vlucht. Europese kanaries worden meestal in paren of kleine groepjes waargenomen. In een donkergroene spar valt vooral het felgeel gekleurde mannetje gemakkelijk op. Vanaf een zichtbare plaats in de kruin van een naaldboom, hoge struik of telefoondraad zingt het een schel, continue 'sisishirlitsjirlitsjirli'.

Habitatvoorkeur

De soort is van mediterrane oorsprong, maar vanaf het begin van de 19^{de} eeuw heeft ze zich uitgebreid naar het noorden. Ze paste zich aan artificiële habitats aan. De aanwezigheid van altijd groene bomen en struiken lijkt noodzakelijk te zijn voor de nestplaats.

Voedsel

Vooraf zaden van onkruiden. 's Zomers ook insecten en dan vooral voor de nestjongen.

Nest en nestplaatskeuze

Europese kanaries nestelen doorgaans in een struik of boom, in een kleine takvork of meer naar het einde van een tak. Het nest is een zorgvuldig gebouwde, stevige kom van plantenstengels, wortels, mos en korstmoss, bekleed met haar, veertjes en plantenpluis.

Broedsel

Doorgaans 4 eieren • Twee legsels per jaar.


Trek- of standvogel

Europese kanaries in België en Nederland zijn deels **standvogel**, deels **trekvogel**.

Mogelijk te verwarren met ...

Sijs (42), vooral de ♀♀ van beide soorten vertonen enige gelijkenis.





Fitis

Phylloscopus trochilus

Lengte: 11 - 12,5 cm
Spanwijdte: 16,5 - 22 cm
Lichaamsgewicht: 6 - 10 g

Frans: Pouillot fitis
Engels: Willow Warbler
Duits: Fitis



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Verschil geslachten

♂ en ♀ zien er hetzelfde uit.

Algemeen

Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om fitis en tijftjaf (30) van elkaar te onderscheiden. Beide vogeltjes zien er nagenoeg identiek uit. De zang van beide soorten is echter totaal verschillend en dus kan je daarmee de ene of andere soort uitsluiten. De fitis is een wat rusteloos, slank vogeltje met een geel-groen verenkleed en een duidelijke, gele wenkbrauwstreep. Als de fitis zich in het voorjaar laat horen, dan kan je min of meer zeggen dat de lente er is. Hij overwintert in tropisch Afrika en kan hier in maart verwacht worden.

Habitatvoorkeur

De soort is typisch voor pioniersstadia van houtige vegetaties. Ze bezet verschillende habitats op voorwaarde dat er voldoende jonge boomopslag of struikgewas met verspreide bomen te vinden is. Een kruiden- of halfheesteretage is steeds gedeeltelijk aanwezig.

Voedsel

Vooraf insecten, ook hun eieren en larven, maar ook wat plantenmateriaal.

Nest en nestplaatskeuze

Fitissen nestelen op de grond, meestal in hoge kruidenbegroeiing of onder lage bladerbedekking aan de randen van bomen en struiken, onder struiken in gras of schaarse kruidenbegroeiing. Het is een overdekt bouwsel van gras, plantenstengels, mos en wortels.

Broedsel

Doorgaans 6-7 eieren • Eén legsel per jaar.


Trek- of standvogel

Fitissen in België en Nederland zijn trekvogel.

Mogelijk te verwarren met ...

Tijftjaf (30), fluitier (40) en spotvogel (64), maar te onderscheiden door hun zang.





Fluiter

Phylloscopus sibilatrix

Lengte: 11 - 12,5 cm
Spanwijdte: 19,5 - 24 cm
Lichaamsgewicht: 7 - 12 g

Frans: Pouillot siffleur
Engels: Wood Warbler
Duits: Waldlaubsänger



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Verschil geslachten

♂ en ♀ zien er hetzelfde uit.

Algemeen

Om fluiters te kunnen zien of horen, moet je naar uitgestrekte loofbossen waar de beuk de dominante boomsoort is. In vergelijking met tjiptjaf (30), fitis (38) en spotvogel (64) is de fluiter de krachtigst gekleurde van onze groene zangers: de bovenzijde is fris groen-geel met een karakteristieke combinatie van een gele wenkbrauwstreep, een grijsachtige teugel en dito oogstreep. De buik is helder wit. De zang bestaat uit een versnellende en luider wordende reeks slagen die eindigt op een triller: 'stjip-tsjip-tsjip-tip-tip-tip-tjurrrrrrrr'.

Habitatvoorkeur

De soort verkiest schaduwrijke, hoogstammige beukenbossen (of loofbossen met de beuk als dominante boomsoort) met een schaarse onderbegroeiing die zangposten levert en mogelijkheden biedt om het nest trapsgewijze te benaderen, wat essentieel lijkt.

Voedsel

Vooraf gevleugelde insecten die hij vangt door in de boomkruinen te foerageren.

Nest en nestplaatskeuze

Fluiters nestelen op de grond, meestal op plaatsen waar enige begroeiing is of waar natuurlijke oneffenheden dekking bieden. Het nest is een koepelvormig bouwsel met een zij-ingang en wordt gemaakt van dorre bladeren, schorsvezels, dode varens en gras.

Broedsel

Doorgaans 6-7 eieren • Eén legsel per jaar, soms twee.

Trek- of standvogel

Fluiters in België en Nederland zijn trekvogel.

Mogelijk te verwarren met ...

Tjiptjaf (30), fitis (38) en spotvogel (64), maar te onderscheiden door hun zang.



