INHOUDSTAFEL

Voorwoord 5
Kleine klitkletser 6
Reuzendwerguil 8
Cohuismus 12
Zeldzame grasmees 15
Kakak 19
Peruviaanse wurgparkiet 21
Groene nabootseling 25
Simpelmees 29
Jan-van-antwerpen 33
Halve gans 34
Afrikaanse navelaar 38
Backingvogel 41
Tweend 42
Kaalmees 45
Fwoppig fwiep fwoepertje 46
Boomsnokker 50
Tuinsnokker 53
Pannenkoekoek 55
Robokopje 57
Gele snuivelaar 58
Wandelaartje 61
Bruingerande bafkop 65
Struikvogel 67
Grote bonte spoeft 71
Siameesje 73
Rouwhaantje 83
Vorte stront-bekschijter 84
'K-hem-het-nog-gezee-arend 87
Ketelfluitertje 89
Gonorhoentje 95
Moniquegier 97
Knoopnekzwaan 101
Kogelvogel 103
Legovogel 107
Wattefokkertje 109
Kijkhutter 113
Hangborstje 120
Flaminguïn 123
Oost-Oezbeekse oorlellikker 125
Schotse,streepstekel-steppestorm stokstaartsperwer 126
Drekduikertje 129
Doremifazant 133
Aha 135
Dromedodo 137
Brulmus 139
Grote flieterjan 142
Tasmaanse taxidermees 144
Vooravondgaal 147
Meikevereter 149
Kontkruipertje 151
Olleke, bolleke en riebesolleke 155
Stratto 159
Middelgrote bruine gesnavelde zwartogige dubbelgevleugelde vliegende drietenige staartmeesfluiter 161

VOORWOORD

Beste natuurliefhebber,

Het is u vast ook al opgevallen: het zijn altijd dezelfde vogels die met alle aandacht gaan lopen. De pimpelmees, de beflijster, het roodborstje, de blauwborst, de kwak… We kennen ze intussen wel.

Nochtans kunnen wij u als ervaren hobbyornithologen met zekerheid vertellen dat de vogelwereld véél rijker, kleurrijker en nog merkwaardiger is dan de gemiddelde vogelgids doet vermoeden.

Hebt u bijvoorbeeld ooit gehoord van de kleine klitkletser, de Peruviaanse wurgparkiet of de kaalmees? Waarschijnlijk niet.

In dit boek vindt u daarom een persoonlijke selectie van enkele van de vreemdere en meest onderbelichte vogelsoorten ter wereld.

Vogels die jarenlang in de schaduw van hun populairdere soortgenoten hebben geleefd, maar dankzij dit boek eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen.

Tom Borremans & Bart Van Peer

KLEINE
Minor
KLITKLETSER
clitorornis crepitans

De kleine klitkletser is een kleine, schuwe zangvogel die voorkomt in grasland, bermen en verwaarloosde akkers. Hij dankt zijn naam aan zijn opvallende gedrag bij het maken van een nest: het herhaaldelijk *klitten* (vastkleven) en weer *loskletsen* van natte modder.



▸ *Een kleine klitkletser kletst een eerder geklitte modderklodder weer los.*

REUZEN-
Microbubo
DWERGUIL
maximus

De reuzendwerguil stamt, zoals zijn naam doet vermoeden, af van de gewone dwerguil. Een populatie dwerguilen leefde in Nieuw-Zeeland reeds zo lang apart, dat de lichaamsgrootte over vele generaties heen geleidelijk weer toenam (gigantisme). Uiteindelijk werd het verschil met de originele dwerguil zo groot dat de populatie als een afzonderlijke soort werd geclassificeerd.

Na verloop van tijd mengde die nieuwe soort zich weer onder gewone dwerguilpopulaties, wat voor veel verwarring zorgt.

Een exemplaar van de reuzendwerguil wordt vaak aangezien voor een grote dwerguil. Terwijl de grote dwerguil géén aparte soort is, maar slechts een uitzonderlijk groot exemplaar van de gewone dwerguil. Omgekeerd wordt een kleine reuzendwerguil door onervaren vogelaars geregeld aangezien voor een gewone dwerguil.



▸ *Een dwerguil naast een reuzendwerguil.*



W*I*ST-JE-DAT...

de rode koolmees een volledig groen vogeltje is, maar vernoemd werd naar de kleur van de menselijke stoelgang na vertering van een gerecht met rodekoolmeesvlees?

Een grote gewone dwerguil naast een kleine reuzendwerguil.

COHUISMUS

Passer cohabitans

In stedelijke gebieden zien we steeds meer varianten van gekende vogelsoorten opduiken.

Zo is de cohuismus ontstaan door nestnood in verstedelijkte omgevingen. Doordat geschikte nestplaatsen, zoals vogelkastjes, bomen en struiken verdwijnen, trekt hij in bij andere huismussen, op voorwaarde dat hun nest groot genoeg is.

Dat ongevraagde inwonen wordt gedoogd zolang de cohuismus actief bijdraagt aan de voedselvoorziening. In ruil voor onderdak fungeert hij als extra verzorger en waarnemer in het samengestelde vogelgezin.





ZELDZAME
Rarimesus
GRASMEES
communis

De zeldzame grasmees is een opmerkelijke vogel, enkel en alleen door zijn bijzonder misleidende naam. De soort is tot op heden namelijk allesbehalve zeldzaam. Integendeel: dankzij het gebrek aan natuurlijke vijanden kent een startende populatie meestal een explosieve groei en veroorzaakt ze op sommige plaatsen aanzienlijke overlast.

Ook het tweede deel van de naam blijkt weinig gelukkig gekozen. De soort leeft niet in graslanden, maar wordt vooral aangetroffen in struikgewas, hagen en boomkruinen. Bovendien wijst modern genetisch onderzoek uit dat de zeldzame grasmees vermoedelijk geen mees is, maar nauwer verwant is aan de mussen.

Onder ornithologen en vogelliefhebbers blijft de naam dan ook een bron van verwarring. Tot op vandaag tast men in het duister over wat de oorspronkelijke taxonoom bezielde om een vogel die niet zeldzaam is, nauwelijks in gras voorkomt én waarschijnlijk geen mees is, toch de naam zeldzame grasmees te geven.

OPGEPAST!

Vogels spotten wordt vaak verward met vogels potten, een gelijkklinkende maar in de kern compleet andere discipline die een volledig andere uitrusting en skillset van de hobbyist vereist.





KAKAK

Cacculus opportunisticus

We kennen allemaal de broedparasitaire koekoek, die haar eieren legt in het nest van een andere vogel. Slechts weinig mensen hebben echter gehoord van de kakak, die gelijkaardig, maar nog vreemder gedrag vertoont. De kakak is een zogenaamde coproparasitaire vogel: hij deponeert doelbewust zijn feces in de nesten van andere vogelsoorten.

De uitwerpselen bevatten sterk geurende stoffen die roofdieren aantrekken. Door concurrerende nesten te bevuilen, verlegt de kakak het geurspoor naar zijn buren, waardoor predatoren vaker het 'besmeurde' nest ontdekken dan zijn eigen rust- of broedplaats. Het zorgt er ook voor dat andere vogelsoorten meer tijd spenderen aan het proper maken van hun nest, waardoor er voor de kakak meer voeding te vinden is.